Australian Government

Vietnamese

Bảo vệ chim của quý vị khỏi cúm gia cầm H5





Cúm gia cầm H5

có thể lây từ chim hoang dã tới đàn gia cầm trong vườn nhà thông qua tiếp xúc với chim bị nhiễm, phân chim, nước uống chung, thức ăn chung, hoặc thiết bị.

Nó có thể lây lan nhanh chóng và gây bệnh nặng hoặc tử vong ở chim.

Theo dõi chim để phát hiện dấu hiệu:


- Yếu đi hoặc bỏ ăn
- Vấn đề thở
- Sưng ở đầu hoặc cổ
- Chết đột ngột
- Đẻ ít trứng hơn

Nếu thấy có gì không bình thường, hãy tìm lời khuyên từ sớm.

Các bước đơn giản để giúp bảo vệ đàn gia cầm của quý vị và động vật hoang dã của chúng ta

1. Không cho chim hoang dã tới gần

Dùng lưới hoặc chuồng trại an toàn để không cho chim hoang dã đến gần đàn gia cầm và thức ăn và nước uống của chúng.





2. Giữ vệ sinh sạch sẽ

Giữ sạch chuồng trại, thiết bị và giầy dép thường xuyên.

3. Rửa tay

Rửa tay trước và sau khi tiếp xúc với chim và trứng.



Tìm hiểu thêm tại birdflu.gov.au hoặc quét mã QR.

Nếu quý vị thấy có nhóm thú vật bị bệnh hoặc bị chết, hãy TRÁNH XA, GHI LẠI và BÁO CÁO tới Đường dây nóng Khẩn cấp về Bệnh Động vật theo số

1800 675 888