


Requin-baleine

Rhincodon typus



Longueur totale maximale: peut-être jusque 1700–2100 cm

Nageoires


1. Première dorsale

De forme générale triangulaire, extrémité largement arrondie chez les jeunes (les nageoires des adultes sont plus dressées et anguleuses, comme sur l'illustration ci-dessus); taches blanchâtres présentes



2. Pectorale

En forme de faux; face supérieure (à gauche) avec des taches blanc crème; face inférieure (à droite) blanche (spécimen jeune)



3. Caudale

Lobe supérieur bien plus grand que le lobe inférieur (moins prononcé chez les adultes); taches blanchâtres présentes

Dents & Vertèbres




Dents minuscules et identiques sur les deux mâchoires. Plus de 300 rangées sur chaque mâchoire. Dents avec une forte cuspide, à bords lisses (non denticulés).



disque vertébral sec (vue de face)

Branchies



arc branchial (frais)



segments branchiaux disposés comme les barreaux d'une échelle (gros plan)

Chair



La chair est le principal produit commercialisé, elle est blanche et à une texture spongieuse (ressemblant à celle du tofu). Pour l'identifier avec certitude, des tests génétiques sont nécessaires.

Projet Barcode: Des informations moléculaires sur le Requin-baleine sont disponibles sur le site Genbank (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/>) ou sur celui de FishBol (<http://www.barcodeoflife.org>).

